


Особенности вакцинопрофилактики



вакцинация против бешенства должна быть проведена не позднее двух недель с момента укуса.

При наличии показаний – инъекция антирабического иммуноглобулина или введение в рану моноклональных антител.

С профилактической целью иммунизируют лиц, работа которых связана с риском заражения (ветеринары, лесники, егери)

Помните, что медицина на сегодняшний день не располагает средствами лечения бешенства. Только своевременно сделанные прививки защитят вас от этого смертельно опасного заболевания!



Сохраните жизнь себе и своим питомцам – сделайте прививку вовремя!



БЕШЕНСТВО – ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ!




Бешенство - инфекционное заболевание, вирусной природы, которое передается животным и людям при тесном контакте со слюной инфицированных особей - при укусах, царапинах, а также загрязнении слюной животного поврежденной кожи и слизистых оболочек.


Источники вируса бешенства



Уличные и домашние собаки



Крупный рогатый скот



Уличные и домашние коты




Летучие мыши




Енотовидные собаки



Волки



Лисы



Лошади



Белки


Восприимчивы домашние и дикие животные всех видов, а также человек. Источником вируса бешенства являются дикие и домашние животные. Разносят бешенство из региона в регион мигрирующие дикие звери, которые могут контактировать с домашними.

Как происходит заражение?

Инфицирование людей обычно происходит в результате глубокого укуса или царапины, нанесенных бешеным животным, при непосредственном контакте слюны инфицированного животного со слизистыми оболочками или свежими ранами на коже человека.

Инкубационный период

Инкубационный период - это время между контактом с вирусом и появлением первых симптомов. В среднем этот период длится от 10 дней до нескольких месяцев.



Симптомы бешенства у животных

- Изменения в поведении (животное становится апатичным, избегает людей, прячется или напротив становится чрезмерно ласковым)
- Ухудшение аппетита, затрудненное глотание
- Обильное слюнотечение
- Животное ведет себя агрессивно
- Животное нападает на людей и других животных, попадающихся ей на пути
- Может наблюдаться извращение аппетита (животное заглатывает несъедобные предметы, палки, камни)
- Гидрофобия (боязнь воды)
- Паралич мышц гортани, глотки, конечностей животного
- Развитие косоглазия, отвисание нижней челюсти, выпадение языка из пасти.

Как защитить себя от бешенства?

1. Необходимо проводить профилактические прививки своим питомцам в ветеринарной станции (клинике).
2. Не допускать контакта домашних животных с безнадзорными.
3. В случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного.
4. Не следует избавляться от животного, покусавшего или оцарапавшего человека. По возможности за ним должно быть установлено десятидневное наблюдение.

Что делать при укусе?



1. Обработка раны - тщательно промыть раневую поверхность в течение 15 минут струей воды с мылом, обработать рану перекисью водорода, края раны обработать спиртосодержащим антисептиком.
2. Немедленно обратиться в медицинское учреждение.
3. Сообщить в государственное ветеринарное учреждение о покусавшем вас животном.

Вакцинопрофилактика - неотъемлемая часть профилактики бешенства!

Только врач в медицинском учреждении может оценить риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит, при необходимости, курс лечебно-профилактической иммунизации.

